

BOLETIM DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS ALTO PARANAÍBA / TRIÂNGULO MINEIRO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

GOVERNO

BOLETIM DE AVISOS Nº 112

DEZEMBRO/2019


1 - LOCALIZAÇÃO / DADOS CLIMÁTICOS E FENOLÓGICOS DO CAFEEIRO

ARAXÁ
Latitude 19° 33' 21"S
Longitude 46° 58' 08"W
Altitude: 960m
PATROCÍNIO
Latitude 18° 59' 35"S
Longitude 46° 59' 01"W
Altitude: 961m
ARAGUARI
Latitude 18° 33' 21,9"S
Longitude 48° 12' 25"W
Altitude: 933m

	Temperatura		Precipitação		Balanço Hídrico (mm)			
Local	Média (°C)		(mm)		T&M ²			
	61/90 ¹	2019	61/90 ¹	2019	ETP	ARM	EXC	DEF
Araxá	21,1	21,7	293,0	232,2	95,3	5,3	0,0	0,0
Patrocínio	21,7	22,1	276,5	327,8	99,0	100,0	76,7	0,0
Araguari	22,8	23,1	344,0	361,8	110,6	66,6	0,0	0,0
Média	21,9	22,3	304,5	307,3	101,6	57,3	25,6	0,0

¹ Média histórica do período entre 1961 e 1990 – Fonte Centro de Ecofisiologia e Biofísica - IAC; ² Método Thorthwaite & Mather.


Ilustração dos níveis de armazenamento de água no solo do balanço hídrico




	Nº Nós/ Ramo	Enfolhamento (%)	Nº Nós / Ramo Esqueletado		
Local	2019	2019	2019		
Araxá					
Patrocínio					
Araguari	4,4	100,0	1,0		
Média	4,4	100,0	1,0		


(Início em setembro de 2019)


1.2- GRÁFICOS CLIMÁTICOS E DO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO





PATROCINIO - MG
















ARAGUARI - MG












2 - DOENÇAS E PRAGAS

	Produtividade	FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%)						
Local	da Lavoura	Ferrugem	Cercospora	Bicho Mineiro	Phoma	Broca	Ácaro	
Araxá	Carga Alta**							
	Carga Baixa**							
Esqueletado								
Patrocínio	Carga Alta							
	Carga Baixa							
Esqueletado								
Araguari*	Carga Alta	0,0	8,0	5,0	6,0	3,0	3,0	
	Carga Baixa	4,0	7,0	3,0	5,0	2,0	3,0	
Esqueletado		0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	
Médias (carga alta e baixa)		2,0	7,5	4,0	5,5	2,5	3,0	

^{*} As avaliações fenológicas, de doenças e pragas nos talhões de Araguari são realizadas em lavouras irrigadas.



3 - ALERTA GERAL

- As chuvas ficaram abaixo da média histórica para Araxá, porém com índices superiores a 230 mm, o que permitiu situação favorável em relação ao teor de água no solo, sem déficit hídrico no final do mês. Para Patrocínio e Araguari, as chuvas foram superiores à média, zerando os déficits e até gerando excedente hídrico de quase 80 mm para Patrocínio. Não há necessidade de reposição da irrigação para as 3 regiões. As temperaturas ficaram ligeiramente acima das médias históricas para as três regiões.
- A presença de folhas infectadas com ferrugem está em média de 2%, demonstrando o início de ciclo evolutivo da doença. Considerando as condições favoráveis para a evolução da ferrugem e o mecanismo de ação dos fungicidas é recomendável o monitoramento, e se necessário a pulverização com fungicida sistêmico protetivo/curativo específico para esta doença.

- Os índices de bicho-mineiro reduziram e estão em torno de 4%, os de ácaro vermelho também reduziram para 3%, recomenda-se monitoramento e caso constatado efetuar o controle.
- A infecção de folhas infectadas com phoma está em torno de 5,5%, e os índices de frutos brocados estão em 2,5%, recomenda-se monitoramento e controle.
- O acumulado de chuvas registrado em Araxá em 2019 foi de 1.311,2 mm, inferior à média histórica que é de 1.575,0 mm. Esse volume de chuvas representou 83% da média histórica.
- O acumulado de chuvas registrado em Patrocínio em 2019 foi de 1.376,4 mm, inferior à média histórica que é de 1.407,5 mm. Esse volume de chuvas representou 97% da média histórica.
- O acumulado de chuvas registrado em Araxá em 2019 foi de 1.183,8 mm, inferior à média histórica que é de 1.606,0 mm. Esse volume de chuvas representou 73% da média histórica.

4- DICAS PARA MONITORAMENTO

Apesar dos monitoramentos serem realizados na região do terço médio da planta, é aconselhável observar as regiões onde a praga/doença inicia seu desenvolvimento apresentando maior incidência e dano, conforme a imagem abaixo.

Phoma
Acaro
Bicho Mineiro

Terço Médio
Cercóspora

Terço Inferior
Solo
Cigarra, Nematóide, Berne e Cochonilha







Colete o terceiro ou quarto par de folhas; (Obs. Broca: frutos da terceira ou quarta roseta)

Vinte a trinta pontos, aleatórios, dentro de cada lavoura

Alternar os lados de coleta entre um ponto e outro

Varginha, 10 de janeiro de 2020.

Equipe responsável

Roque Antônio Ferreira (Ag. Ativ. Agropec. MAPA/PROCAFÉ)

Rodrigo Naves Paiva (Engº Agrº. Fundação PROCAFÉ)

André Luís Teixeira Fernandes (Engº Agrº. Universidade De Uberaba)

CAPAL - ACARPA/FUNDACCER - UNIUBE