

BOLETIM DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS SUL DE MINAS GERAIS





BOLETIM DE AVISOS Nº 280


JANEIRO/2022

1 - LOCALIZAÇÃO / DADOS CLIMÁTICOS E FENOLÓGICOS DO CAFEEIRO

| VARGINHA Latitude 21° 34' 00"S Longitude 45° 24' 22"W Altitude: 940m | | Temperatura Média (°C) | | Precipitação (mm) | | Balanço Hídrico (mm) T&M² | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|------|----------------------|-------|------------------------------|-------|-------|-----|
| CARMO DE MINAS Latitude 22º 10' 31"S | Local | 74/21 ¹ | 2022 | 74/21 ¹ | 2022 | ETP | ARM | EXC | DEF |
| Longitude 45° 09' 03"W Altitude: 1080m | Varginha | 22,5 | 21,9 | 261,1 | 462,8 | 98,1 | 100,0 | 364,7 | 0,0 |
| BOA ESPERANÇA Latitude 21° 03' 59"S | Carmo Minas ³ | 21,4 | 20,8 | 272,8 | 436,5 | 86,0 | 100,0 | 350,5 | 0,0 |
| Longitude 45° 34' 37"W Altitude: 830m | Boa Esperança ³ | 23,6 | 23,2 | 208,1 | 285,8 | 112,5 | 88,8 | 184,5 | 0,0 |
| MUZAMBINHO Latitude 21° 20' 47"S | Muzambinho | 22,0 | 22,1 | 217,9 | 295,0 | 100,5 | 100,0 | 194,5 | 0,0 |
| Longitude 46° 32' 04"W Altitude: 1033m | Média | 22,4 | 22,0 | 240,0 | 370,0 | 99,3 | 97,2 | 273,6 | 0,0 |

¹ Média histórica do período entre 1974 e 2021 – Varginha; ² Método Thorthwaite & Mather; ³ Média do período de 2010 a 2021.

Ilustração dos níveis de armazenamento de água no solo do balanço hídrico




| Local | Nº Nós/ Ramo | | Enfolhamento (%) | | Nº Nós / Ramo Esqueletado | |
|---------------|-----------------|------|---------------------|------|------------------------------|--|
| | 99 a 21 | 2022 | 99 a 21 | 2022 | 2022 | |
| Varginha | 5,3 | 5,9 | 97,9 | 80,6 | 6,2 | |
| Carmo Minas | | 6,3 | | 94,3 | 5,2 | |
| Boa Esperança | | 6,1 | | 94,8 | 6,5 | |
| Muzambinho | | 6,7 | | 90,0 | 6,6 | |
| Média | | 6,2 | | 89,9 | 6,1 | |


(Início em setembro de 2021)


OBS: Não foi possível ir a campo em Carmo de Minas para avaliar os dados fenológicos.


1.2- GRÁFICOS CLIMÁTICOS E DO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO





CARMO DE MINAS
















BOA ESPERANÇA
















MUZAMBINHO












2 - DOENÇAS E PRAGAS


VARGINHA

| Tipo de plantio e | FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%) | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|--|--|
| produtividade | Ferrugem | Ferrugem Cercospora Bicho Mineiro Phoma Broo | | | | | | |
| Carga Alta | 44,6 | 2,4 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Carga Baixa | 37,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Média | 40,9 | 1,7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Esqueletado | 36,5 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |




CARMO DE MINAS

| Tipo de plantio e | FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%) | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|------------|---------------|-------|-------|-------|--|--|
| produtividade | Ferrugem | Cercospora | Bicho Mineiro | Phoma | Broca | Ácaro | | |
| Carga Alta | 10,1 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | | |
| Carga Baixa | 10,3 | 7,2 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | | |
| Média | 10,2 | 5,6 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 0,0 | | |
| Esqueletado | 9,4 | 8,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |



BOA ESPERANCA

| Tipo de plantio e | FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%) | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|------------|---------------|-------|-------|-------|--|--|
| produtividade | Ferrugem | Cercospora | Bicho Mineiro | Phoma | Broca | Ácaro | | |
| Carga Alta | 13,4 | 5,2 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Carga Baixa | 11,1 | 8,1 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Média | 12,3 | 6,6 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | | |
| Esqueletado | 4,1 | 6,1 | 3,1 | 0,0 | | 0,0 | | |



MUZAMBINHO


| Tipo de plantio e | FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%) | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|--|--|
| produtividade | Ferrugem | errugem Cercospora Bicho Mineiro Phoma Broca | | | | | | |
| Carga Alta | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Carga Baixa | 18,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Média | 20,6 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | |
| Esqueletado | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 0,0 | | |

3 - ALERTA GERAL

- Em janeiro, as precipitações das quatro regiões ficaram acima da média histórica. As quatro regiões estão com armazenamento completo e foram gerados excedente hídricos médios na ordem de 273 mm, não havendo necessidade de irrigação. As temperaturas ficaram abaixo das médias históricas para as quatro regiões.
- Os índices de infecção de ferrugem aumentaram drasticamente, e estão na média das quatro regiões em 21% de folhas infectadas. Em Varginha o índice da ferrugem aumentou de 21% para 41% de folhas infectadas. Nestas condições deve-se realizar o controle imediato com fungicida sistêmico curativo específico para esta doença.
- Em Carmo de Minas o índice de grão brocados está na ordem de 2,3%, deve-se realizar amostragens, caso constatado, efetuar o controle com inseticida específico.

4- DICAS PARA MONITORAMENTO

Apesar dos monitoramentos serem realizados na região do terço médio da planta, é aconselhável observar as regiões onde a praga/doença inicia seu desenvolvimento apresentando maior incidência e dano, conforme a imagem abaixo.





Colete o terceiro ou quarto par de folhas; (Obs. Broca: frutos da terceira ou quarta roseta)



Vinte a trinta pontos, aleatórios, dentro de cada lavoura



Alternar os lados de coleta entre um ponto e outro

Varginha, 10 de fevereiro de 2022.

Equipe responsável

Rodrigo Naves Paiva (Engº Agrº MSc. Fundação PROCAFÉ)

IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho, MG