

# BOLETIM DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS ALTA MOGIANA





## **BOLETIM DE AVISOS Nº 80**

#### **AGOSTO/2021**


# 1 – LOCALIZAÇÃO / DADOS CLIMÁTICOS E FENOLÓGICOS DO CAFEEIRO

FRANCA
Latitude 20° 28' 19"S
Longitude 47° 24' 33"O
Altitude: 1025 m

Local	Temperatura Média (°C)		Precipitação (mm)		Balanço Hídrico (mm) T&M³			
	07/20 <sup>1</sup>	2021	95/20 <sup>2</sup>	2021	ETP	ARM	EXC	DEF
Franca	20,8	21,2	19,5	0,6	77,6	0,0	0,0	234,2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Média histórica do período entre 2007 a 2020 – Fonte COCAPEC;

## Ilustração dos níveis de armazenamento de água no solo do balanço hídrico




	Nº Nós/ Ramo	Enfolhamento (%)	Nº Nós / Ramo Esqueletado		
Local	2021	2021	2021		
Franca	10,6	33,0	11,9		

(Início em setembro de 2020)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Média histórica do período 1995 a 2020 – Fonte COCAPEC;


<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Método Thorthwaite & Mather.

# 1.2- GRÁFICOS CLIMÁTICOS E DO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO



## 2 - DOENÇAS E PRAGAS

	Produtividade	FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%)						
Local	da Lavoura	Ferrugem	Cercospora	Bicho Mineiro	Phoma	Broca	Ácaro	
Franca	Carga Alta	3,0	3,0	12,1	0,0		0,0	
	Carga Baixa	4,5	4,5	15,9	0,0		0,0	
Esqueletado		10,2	8,2	14,3	0,0		0,0	
Médias (carga alta e baixa)		3,8	3,8	14,0	0,0		0,0	




## 3 - ALERTA GERAL

- Em agosto, novamente as precipitações ficaram abaixo da média histórica para a região de Franca, com isso o déficit hídrico aumentou e está na ordem de 234mm. Os produtores irrigantes devem repor lâminas fornecendo a evapotranspiração diária afim de manter a hidratação das plantas e evitando prejuízos para a próxima safra. Em Franca a temperatura média ficou (0,4°C) acima da média histórica.
- A ferrugem diminuiu devido a intensa desfolha e está com média de 3,8% de folhas infectadas.
- Na região de Franca o índice de bicho-mineiro aumentou e está em 14,0% de folhas minadas.

#### 4- DICAS PARA MONITORAMENTO

Apesar dos monitoramentos serem realizados na região do terço médio da planta, é aconselhável observar as regiões onde a praga/doença inicia seu desenvolvimento apresentando maior incidência e dano, conforme a imagem abaixo.





Colete o terceiro ou quarto par de folhas; (Obs. Broca: frutos da terceira ou quarta roseta)



Vinte a trinta pontos, aleatórios, dentro de cada lavoura



Alternar os lados de coleta entre um ponto e outro

Varginha, 10 de setembro de 2021.

#### Equipe responsável

Marcelo Jordão Filho (Engº Agrº Fundação PROCAFÉ)

Rodrigo Naves Paiva (Engº Agrº MSc. Fundação PROCAFÉ)

COCAPEC – FUNDAÇÃO DO CAFÉ DA ALTA MOGIANA