


BOLETIM DE AVISOS Nº 134
OUTUBRO/2021
1 – LOCALIZAÇÃO / DADOS CLIMÁTICOS E FENOLÓGICOS DO CAFEIEIRO

ARAXÁ Latitude 19° 33' 21"S Longitude 46° 58' 08"W Altitude: 960m PATROCÍNIO Latitude 18° 59' 35"S Longitude 46° 59' 01"W Altitude: 961m ARAGUARI Latitude 18° 33' 21,9"S Longitude 48° 12' 25"W Altitude: 933m	Local	Temperatura Média (°C)		Precipitação (mm)		Balanço Hídrico (mm) T&M ²			
		61/90 ¹	2021	61/90 ¹	2021	ETP	ARM	EXC	DEF
	Araxá	21,4	21,6	154,0	330,4	89,3	24,3	0,0	0,0
	Patrocínio	21,4	21,7	144,0	192,2	89,8	0,0	0,0	134,6
	Araguari	23,8	23,4	145,0	212,6	107,6	0,0	0,0	251,1
	Média	22,2	22,2	147,7	245,1	95,6	8,1	0,0	128,6






¹ Média histórica do período entre 1961 e 1990 – Fonte Centro de Ecofisiologia e Biofísica - IAC; ² Método Thornthwaite & Mather.

Ilustração dos níveis de armazenamento de água no solo do balanço hídrico







Local	Nº Nós/ Ramo	Enfolhamento (%)	Nº Nós / Ramo Esqueletado
	2021	2021	2021
Araxá	2,5	100,0	---
Patrocínio	---	---	---
Araguari	---	---	---
Média	---	---	---

(Início em setembro de 2021)






1.2- GRÁFICOS CLIMÁTICOS E DO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO



PATROCÍNIO – MG



ARAGUARI – MG



2 - DOENÇAS E PRAGAS

Local	Produtividade da Lavoura	FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%)					
		Ferrugem	Cercospora	Bicho Mineiro	Phoma	Broca	Ácaro
Araxá	Carga Alta	0,0	0,0	0,0	4,0	---	0,0
	Carga Baixa	0,0	0,0	0,0	9,0	---	---
Esqueletado		---	---	---	---	---	---
Patrocínio	Carga Alta	---	---	---	---	---	---
	Carga Baixa	---	---	---	---	---	---
Esqueletado		---	---	---	---	---	---
Araguari*	Carga Alta	---	---	---	---	---	---
	Carga Baixa	---	---	---	---	---	---
Esqueletado		---	---	---	---	---	---
Médias (carga alta e baixa)		0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0

* As avaliações fenológicas, de doenças e pragas nos talhões de Araguari são realizadas em lavouras irrigadas.



3 - ALERTA GERAL

- As chuvas em outubro, finalmente, foram superiores às médias históricas, o que permitiu zerar o déficit para a região de Araxá, que já tem armazenamento positivo após vários meses. Porém, para Patrocínio e Araguari, ainda não foram suficientes para repor os déficits, que diminuiram, mas ainda continuam relativamente altos (135 mm para Patrocínio e 251 mm para Araguari). Não há necessidade de irrigação para Araxá, mas para Patrocínio e Araguari há necessidade de reposição das perdas acumuladas. Pela fase da cultura, é imprescindível repor as perdas, para garantir o pegamento das floradas, evitando prejuízos futuros. As temperaturas ficaram próximas às médias históricas para as três regiões.

- Os índices médios de infecção de phoma nas folhas estão em 6,5% nos talhões de Araxá.

4- DICAS PARA MONITORAMENTO

Apesar dos monitoramentos serem realizados na região do terço médio da planta, é aconselhável observar as regiões onde a praga/doença inicia seu desenvolvimento apresentando maior incidência e dano, conforme a imagem abaixo.



Colete o terceiro ou quarto par de folhas;
(Obs. Broca: frutos da terceira ou quarta roseta)



Vinte a trinta pontos, aleatórios, dentro de cada lavoura



Alternar os lados de coleta entre um ponto e outro

Varginha, 10 de novembro de 2021.

Equipe responsável

Rodrigo Naves Paiva (Engº Agrº. Fundação PROCAFÉ)

André Luís Teixeira Fernandes (Engº Agrº. Universidade De Uberaba)