

BOLETIM DE AVISOS Nº 162


FEVEREIRO/2024

1 – LOCALIZAÇÃO / DADOS CLIMÁTICOS E FENOLÓGICOS DO CAFEIEIRO

Local	Temperatura Média (°C)		Precipitação (mm)		Balanço Hídrico (mm) T&M ²			
	61/90 ¹	2024	61/90 ¹	2024	ETP	ARM	EXC	DEF
ARAXÁ Latitude 19° 33' 21"S Longitude 46° 58' 08"W Altitude: 960m								
PATROCÍNIO Latitude 18° 59' 35"S Longitude 46° 59' 01"W Altitude: 961m								
ARAGUARI Latitude 18° 33' 21,9"S Longitude 48° 12' 25"W Altitude: 933m								
Média	22,3	22,9	208,1	131,8	94,6	50,8	28,4	0,0

¹ Média histórica do período entre 1961 e 1990 – Fonte Centro de Ecofisiologia e Biofísica - IAC; ² Método Thornthwaite & Mather.






Ilustração dos níveis de armazenamento de água no solo do balanço hídrico








Local	Nº Nós/ Ramo	Enfolhamento (%)	Nº Nós / Ramo Esqueletado
	2024	2024	2024
Araxá	6,5	79,4	7,9
Patrocínio	---	---	---
Araguari	---	---	---
Média	---	---	---

(Início em setembro de 2023)






1.2– GRÁFICOS CLIMÁTICOS E DO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO



PATROCÍNIO – MG



ARAGUARI – MG



2 - DOENÇAS E PRAGAS

Local	Produtividade da Lavoura	FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%)					
		Ferrugem	Cercospora	Bicho Mineiro	Phoma	Broca	Ácaro
Araxá	Carga Alta	68,0	22,0	2,0	7,0	0,0	7,0
	Carga Baixa	9,0	17,0	0,0	7,0	0,0	1,0
Esqueletado		22,0	18,0	1,0	10,0	---	0,0
Patrocínio	Carga Alta	---	---	---	---	---	---
	Carga Baixa	---	---	---	---	---	---
Esqueletado		---	---	---	---	---	---
Araguari	Carga Alta	---	---	---	---	---	---
	Carga Baixa	---	---	---	---	---	---
Esqueletado		---	---	---	---	---	---
Médias (carga alta e baixa)		38,5	19,5	1,0	7,0	0,0	4,0

3 - ALERTA GERAL



- As chuvas em fevereiro de 2024 foram inferiores às médias históricas para as três regiões, porém, suficientes para não ter déficits hídricos para nenhuma delas. Para Araxá, o excedente hídrico baixou para 85 mm. Neste período, em que as temperaturas médias já são superiores a 19°C para as três regiões, há necessidade de reposição total das lâminas de irrigação, para não haver prejuízos para a próxima safra. As temperaturas médias do ar foram superiores às médias históricas para as três regiões.

- A incidência da ferrugem que estava em 25,2% no mês anterior subiu para 38,5% na média nos talhões de carga baixa/alta e está em 22% de infecção no talhão esqueletado. Atenção, deve-se realizar amostragem e o controle imediato com fungicida sistêmico curativo específico para esta doença.

- Nos talhões de Araxá foram constatados uma incidência média 7% de folhas infectadas com phoma nas lavouras de carga alta/baixa, e 10% no talhão esqueletado, e 4% de folhas infestadas por ácaro vermelho nos talhões de carga alta/baixa.

4- DICAS PARA MONITORAMENTO

Apesar dos monitoramentos serem realizados na região do terço médio da planta, é aconselhável observar as regiões onde a praga/doença inicia seu desenvolvimento apresentando maior incidência e dano, conforme a imagem abaixo.



Colete o terceiro ou quarto par de folhas;
(Obs. Broca: frutos da terceira ou quarta roseta)



Vinte a trinta pontos, aleatórios, dentro de cada lavoura



Alternar os lados de coleta entre um ponto e outro

Varginha, 10 de março de 2024.

Equipe responsável

Rodrigo Naves Paiva (Engº Agrº. Fundação PROCAFÉ)

André Luís Teixeira Fernandes (Engº Agrº. Universidade De Uberaba)