

BOLETIM DE AVISOS Nº 126

JULHO/2025

1 – LOCALIZAÇÃO / DADOS CLIMÁTICOS E FENOLÓGICOS DO CAFEIEIRO


FRANCA Latitude 20° 28' 19"S Longitude 47° 24' 33"O Altitude: 1025 m	Local	Temperatura Média (°C)		Precipitação (mm)		Balanço Hídrico (mm) T&M ³			
		07/24 ¹	2025	95/24 ²	2025	ETP	ARM	EXC	DEF
	Franca	19,4	18,8	11,7	6,4	55,0	0,0	0,0	48,9

¹ Média histórica do período entre 2007 a 2024 – Fonte COCAPEC;

² Média histórica do período 1995 a 2024 – Fonte COCAPEC;

³ Método Thornthwaite & Mather.

Ilustração dos níveis de armazenamento de água no solo do balanço hídrico








Local	Nº Nós/ Ramo	Enfolhamento (%)	Nº Nós / Ramo Esqueletado
	2025	2025	2025
Franca*	8,7	42,6	14,5

(Início em setembro de 2024)


*Os campos de avaliação em Franca são irrigados por sistema de gotejamento.

1.2- GRÁFICOS CLIMÁTICOS E DO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO



2 - DOENÇAS E PRAGAS

Local	Produtividade da Lavoura	FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%)					
		Ferrugem	Cercospora	Bicho Mineiro	Phoma	Broca	Ácaro
Franca	Carga Alta	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Carga Baixa	19,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Esqueletado		12,2	4,9	1,2	0,0	---	0,0
Médias (carga alta e baixa)		35,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0




3 - ALERTA GERAL

- Em julho **a precipitação na região de Franca foi de 6 mm.** O normal na média da região seria uma **precipitação de 11 mm.** A região está com um déficit hídrico na ordem de 49 mm.
- Em Franca a **temperatura média do ar foi (18,8°C), ficando abaixo da média** histórica (19,4°C). Para os **cafeicultores irrigantes**, há necessidade de reposição de água, recomenda-se que, para qualquer estratégia, **deve-se acompanhar as precipitações, o status de água no solo e as condições das plantas** para manejar a irrigação de forma adequada.
- A incidência de ferrugem está em 35 % na média dos talhões avaliados em Franca.
- Atenção (período de carência) entre a data de aplicação e colheita.

DICAS PARA MONITORAMENTO

Apesar dos monitoramentos serem realizados na região do terço médio da planta, é aconselhável observar as regiões onde a praga/doença inicia seu desenvolvimento apresentando maior incidência e dano, conforme a imagem abaixo.



Colete o terceiro ou quarto par de folhas;
(Obs. Broca: frutos da terceira ou quarta roseta)



Vinte a trinta pontos, aleatórios, dentro de cada lavoura



Alternar os lados de coleta entre um ponto e outro

Varginha, 10 de agosto de 2025.

Equipe responsável

Marcelo Jordão Filho (Engº Agrº Fundação PROCAFÉ)

Rodrigo Naves Paiva (Engº Agrº MSc. Fundação PROCAFÉ)

COCAPEC – FUNDAÇÃO DO CAFÉ DA ALTA MOGIANA