

BOLETIM DE AVISOS Nº 118

NOVEMBRO/2024

1 – LOCALIZAÇÃO / DADOS CLIMÁTICOS E FENOLÓGICOS DO CAFEIEIRO


FRANCA Latitude 20° 28' 19"S Longitude 47° 24' 33"O Altitude: 1025 m	Local	Temperatura Média (°C)		Precipitação (mm)		Balanço Hídrico (mm) T&M ³			
		07/23 ¹	2024	95/23 ²	2024	ETP	ARM	EXC	DEF
	Franca	22,9	22,9	203,8	283,5	103,4	0,0	0,0	105,4

¹ Média histórica do período entre 2007 a 2023 – Fonte COCAPEC;

² Média histórica do período 1995 a 2023 – Fonte COCAPEC;

³ Método Thornthwaite & Mather.

Ilustração dos níveis de armazenamento de água no solo do balanço hídrico








Local	Nº Nós/ Ramo	Enfolhamento (%)	Nº Nós / Ramo Esqueletado
	2024	2024	2024
Franca*	3,4	89,0	5,2

(Início em setembro de 2024)


*Os campos de avaliação em Franca são irrigados por sistema de gotejamento.

1.2- GRÁFICOS CLIMÁTICOS E DO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO



2 - DOENÇAS E PRAGAS

Local	Produtividade da Lavoura	FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%)					
		Ferrugem	Cercospora	Bicho Mineiro	Phoma	Broca	Ácaro
Franca	Carga Alta	0,0	1,4	0,0	1,0	0,0	0,0
	Carga Baixa	0,0	5,3	0,0	1,0	0,0	0,0
Esqueletado		0,0	11,0	0,0	2,0	---	0,0
Médias (carga alta e baixa)		0,0	3,4	0,0	1,0	0,0	0,0




3 - ALERTA GERAL

- Em novembro a precipitação na região de Franca foi de 283 mm. O normal na média da região seria uma precipitação de 203 mm. A região diminuiu seu déficit hídrico acumulado de 285 mm para 105 mm no final de novembro. Em Franca a temperatura média do ar foi (22,9°C), ficando igual a média histórica (22,9°C). Os produtores irrigantes devem acompanhar as precipitações de dezembro e caso necessário suplementar lâminas de irrigação para suprir a evapotranspiração do período.

- Os índices de folhas infectadas por phoma estão em 1,0% na média dos talhões de carga alta/baixa e em 2,0% no talhão esqueletado.

DICAS PARA MONITORAMENTO

Apesar dos monitoramentos serem realizados na região do terço médio da planta, é aconselhável observar as regiões onde a praga/doença inicia seu desenvolvimento apresentando maior incidência e dano, conforme a imagem abaixo.



Terço Superior	Phoma Ácaro Bicho Mineiro
Terço Médio	Cercóspora
Terço Inferior	Ferrugem Broca
Solo	Cigarra, Nematóide, Berne e Cochonilha



Colete o terceiro ou quarto par de folhas;
(Obs. Broca: frutos da terceira ou quarta roseta)



Vinte a trinta pontos, aleatórios, dentro de cada lavoura



Alternar os lados de coleta entre um ponto e outro

Varginha, 10 de dezembro de 2024.

Equipe responsável

Marcelo Jordão Filho (Engº Agrº Fundação PROCAFÉ)

Rodrigo Naves Paiva (Engº Agrº MSc. Fundação PROCAFÉ)

COCAPEC – FUNDAÇÃO DO CAFÉ DA ALTA MOGIANA



Alameda do Café, 1000
Vila Verônica – Varginha/MG



www.fundacaoprocafe.com.br



+55 35 32141411