

# BOLETIM DE AVISOS FITOSSANITÁRIOS ALTA MOGIANA





### **BOLETIM DE AVISOS Nº 76**

#### **ABRIL/2021**


# 1 - LOCALIZAÇÃO / DADOS CLIMÁTICOS E FENOLÓGICOS DO CAFEEIRO

FRANCA
Latitude 20° 28' 19"S
Longitude 47° 24' 33''O
Altitude: 1025 m

Local	Temperatura Média (°C)		Precipitação (mm)		Balanço Hídrico (mm) T&M³			
	07/20 <sup>1</sup>	2021	95/20 <sup>2</sup>	2021	ETP	ARM	EXC	DEF
Franca	22,0	21,3	82,9	36,6	77,7	0,0	0,0	20,3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Média histórica do período entre 2007 a 2020 – Fonte COCAPEC;

## Ilustração dos níveis de armazenamento de água no solo do balanço hídrico




	Nº Nós/ Ramo	Enfolhamento (%)	Nº Nós / Ramo Esqueletado		
Local	2021	2021	2021		
Franca	9,4	74,0	10,9		

(Início em setembro de 2020)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Média histórica do período 1995 a 2020 – Fonte COCAPEC;


<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Método Thorthwaite & Mather.

## 1.2- GRÁFICOS CLIMÁTICOS E DO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO



## 2 - DOENÇAS E PRAGAS

	Produtividade	FOLHAS/FRUTOS ATACADOS (%)						
Local	da Lavoura	Ferrugem	Cercospora	Bicho Mineiro	Phoma	Broca	Ácaro	
Franca	Carga Alta	16,0	12,8	5,3	0,0	1,0	0,0	
	Carga Baixa	12,6	9,2	6,9	0,0	1,0	0,0	
Esqueletado		5,1	11,0	5,1	6,0	0,0	0,0	
Médias (carga alta e baixa)		14,3	4,0	6,1	0,0	1,0	0,0	




#### 3 - ALERTA GERAL

- Em abril, novamente as precipitações ficaram abaixo da média histórica para a região de Franca. A região está com um déficit hídrico na ordem de 20,3 mm. O normal para este período é que tivéssemos um armazenamento próximo de 60 mm. Para os produtores irrigantes desta região é extremamente importante repor uma lâmina de 80 mm para voltar a ter armazenamento. Na região de Franca a temperatura média ficou (0,7°C) acima da média histórica.
- A ferrugem aumentou e está com média de 14,3% de folhas infectadas.
- Atenção (período de carência) entre a data de aplicação e colheita.

#### 4- DICAS PARA MONITORAMENTO

Apesar dos monitoramentos serem realizados na região do terço médio da planta, é aconselhável observar as regiões onde a praga/doença inicia seu desenvolvimento apresentando maior incidência e dano, conforme a imagem abaixo.





Colete o terceiro ou quarto par de folhas; (Obs. Broca: frutos da terceira ou quarta roseta)



Vinte a trinta pontos, aleatórios, dentro de cada lavoura



Alternar os lados de coleta entre um ponto e outro

Varginha, 10 de maio de 2021.

Equipe responsável

Marcelo Jordão Filho (Engo Agro Fundação PROCAFÉ)

Rodrigo Naves Paiva (Engº Agrº MSc. Fundação PROCAFÉ)

COCAPEC - FUNDAÇÃO DO CAFÉ DA ALTA MOGIANA